

# 新型コロナウイルスワクチン 3回目接種に関するお知らせ

下記の接種体制のとおり実施する予定です。

<b>接種対象者</b>	歌志内市に住所を有している方で、2回目を接種した18歳以上の方。 ※12歳以上18歳未満の方の接種については、未定です。
<b>接種会場</b>	歌志内市立病院
<b>ワクチン</b>	ファイザー、モデルナ ※接種日により使用するワクチンを振り分けます。
<b>接種日等</b>	2月22日以降、順次開始します。 ※2月は平日、3月は土日の接種を予定しています。
<b>接種までの流れ</b>	①接種日が近くなりましたら、予診票等を郵送します。 ※窓空き封筒で送ります。 ②予診票とは別に、接種日と時間等を記載したハガキを送ります。
<b>予約方法</b>	・ハガキが届いた方は、予約不要です。 ※都合が悪い方は日程等の調整をしますので、ご連絡ください。 ・2回目を他市町村で接種し、3回目を歌志内市で接種する方は、保健介護グループまでご連絡ください。

他市町村で2回目を接種した後、歌志内市へ転入された方  
予診票が届かない場合は、保健介護グループにご連絡ください。

初めて（1，2回目）の接種を希望される方  
保健介護グループにご相談ください。

5歳～11歳のワクチン接種については、詳細が決まり次第、ご案内を送付します。

# 3回目接種に使用するワクチンについて

## 使用するワクチン

1・2回目に接種したワクチンに関わらず、ファイザーまたはモデルナのワクチンを使用します。ファイザーは1・2回目の接種量と同量ですが、モデルナは半量になります。

## 3回目の接種の安全性と効果

### 【安全性】

ファイザー及びモデルナの薬事承認において、3回目の接種後7日間以内の副反応は、1・2回の接種後のものと比べると、どちらのワクチンにおいても、一部の症状の出現率に差があるものの、おおむね1・2回目と同様の症状がみられました。

症状	発現割合	
	ファイザー	モデルナ
	2回目→3回目接種後	2回目→3回目接種後
疼痛	78.3→83.0% ↑	88.3→83.8% ↓
疲労	59.4→63.7% ↑	65.4→58.7% ↓
頭痛	54.0→48.4% ↓	58.8→55.1% ↓
筋肉痛	39.3→39.1% ↓	58.1→49.1% ↓
悪寒	37.8→29.1% ↓	44.3→35.3% ↓
関節痛	23.8→25.3% ↓	42.9→41.3% ↓
38度以上の発熱	16.4→8.7% ↓	15.5→6.6% ↓
リンパ節症	0.4→5.2% ↑	14.2→20.4% ↑



※ファイザーのリンパ節症は、接種後1か月以内のデータ

### 【効果】

3回目を接種した人の方が、していない人よりも、新型コロナウイルスに感染する人や重症化する人が少ないと報告されています。

## 1・2回目と異なるワクチンを用いて3回目を接種した場合の安全性と効果

### 【安全性】

3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目と同じワクチンを接種しても、異なるワクチンを接種しても安全性の面で許容される。

### 【効果】

1・2回目接種でファイザーのワクチンを受けた人が、3回目でファイザーを接種した場合と、モデルナを接種した場合のいずれにおいても、抗体価が十分上昇する。

### 【よくある質問】

**Q モデルナのワクチンは副反応が強いと聞いていますが大丈夫ですか？**

A 3回目接種に使用するモデルナのワクチンは、1・2回目接種で用いた量の半量になります。2回目接種後と比較して、発熱や疲労などの接種後の症状が少ないことが報告されています。